

JASKRA

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI JASKRY

Jaskra to najważniejsza przyczyna
nieodwracalnej utraty wzroku¹.

Szacuje się, że 50% osób z jaskrą
nie wie, że jest chora¹.



CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ROZWOJÓWI JASKRY:



Jaskra w rodzinie²



Wiek > 35 r.ż.²



Cukrzyca²



Migreny²



Krótkowzroczność²



Uraz oka²



Nadciśnienie
lub niskie ciśnienie
tętnicze²



Leczenie lekami
zawierającymi kortyzon²



Palenie papierosów³



Zaburzenia krążenia
obwodowego, zimne
ręce i stopy³



Zaburzenia gospodarki
tłuszczowej,
hipercholesterolemia,
hiperlipidemia³

W przypadku wystąpienia jednego lub więcej
wyżej wymienionych czynników,
wykonaj badania specjalistyczne w kierunku jaskry.
To pierwszy krok do zdrowych oczu.



Pfizer Polska Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 B
tel.: +48 (22) 335 61 00, fax: +48 (22) 335 61 11

Referencje: 1. Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Jamroz-Witkowska, Jaromir Wasyluk (2008) Jaskra pierwotna otwartego kąta i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jako główne przyczyny nieodwracalnej utraty wzroku we współczesnym świecie. Nowe możliwości diagnostyki i terapii. Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2008, s. 42-48.

2. Worley A, Grimmer-Somers K. Risk factors for glaucoma: what do they really mean? Aus J Prim Health 2011;17:233-9.

3. Halina Olszewska, Katarzyna Wojciechowska, Anna Jegier - Profilaktyka jaskry. Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2009, s. 29-37.

WPOLXAL8017187/01/2017