

Tytuł: Obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego – wyzwanie diagnostyczne

Autorzy: lek. med. Małgorzata Rogaczewska^{1,2}, dr hab. n. med. Marcin Stopa^{1,2}

Afiliacja: 1. Oddział Kliniczny Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2. Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

54-letnia kobieta zgłosiła się na ostry dyżur okulistyczny z powodu stopniowego pogarszania się ostrości wzroku wraz z towarzyszącym bólem głowy od ok. 2 tygodni. W wywiadzie pacjentka podawała palenie papierosów oraz stosowanie hormonalnej terapii zastępczej. Ponadto, 3 tygodnie wcześniej, przebyła infekcję górnych dróg oddechowych.

Badanie przedmiotowe wykazało obniżoną ostrość wzroku OP (0.4) oraz OL (0.5). Ciśnienie wewnątrzgałkowe było obustronnie prawidłowe. Zaburzenia widzenia barw nie stwierdzono. Odcinek przedni OPL nie wykazywał odchyłeń od stanu prawidłowego, natomiast w badaniu dna oka uwidoczniło obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego wraz z niewielkim odczynem zapalnym w ciele szklistym.

W diagnostyce różnicowej uwzględniono różne przyczyny występowania obustronnego obrzęku tarczy n. II. Wykonano szczegółowe badania laboratoryjne oraz obrazowe. Po ustaleniu ostatecznej diagnozy, zastosowano odpowiednią terapię uzyskując poprawę ostrości wzroku obu oczu (1.0).