

**Tytuł: Obrzęk tarczy**

Autor: dr n. med. Karolina Dulczewska-Cichecka, dr hab. n. med. Zofia Michalewska

Afilacje: *Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia”, Łódź, Gabinet Okulistyczny N&M, Łódź, Oddział Okulistyczny Miejskiego Centrum Medycznego im. K. Jonchera, Łódź*

33 letni pacjent zgłosił się na ostry dyżur okulistyczny z powodu pogorszenia widzenia oraz nasilenia objawów subiektywnych pod postacią błysków przed oczami. Pacjent zgłaszał silny ból głowy oraz tępy ból w okolicy czoła i nosa, który wiązał z zapaleniem zatok. Chory wcześniej leczony był laryngologicznie z powodu przewlekłego zapalenia zatok, operowany z powodu przerostu migdałków oraz skrzywienia przegrody nosa. W badaniu okulistycznym stwierdzono pogorszenie widzenia okiem prawym Vop-0,4, Vol-1,2 oraz obrzęk tarczy n II obu oczu. Pacjenta przekazano na oddział neurologiczny gdzie rozpoznano zakrzepicę zatok żylnych mózgu i żyły szyjnej wewnętrznej prawej. Po leczeniu preparatem Diuramid oraz Pradaxa objawy obrzęku tarczy n II zmniejszyły się, a ostrość wzroku wynosiła Vop-0,8, Vol-1,2. Pacjent nadal jest w trakcie szczegółowej diagnostyki, pozostaje pod opieką neurologiczną i okulistyczną, co 2 tygodnie powtarzane są u niego badanie SOCT oraz pole widzenia.