

## ***Tytuł: Makrotętniak tętnicy środkowej siatkówki-opis przypadku***

Autorzy: dr Magdalena Trębińska, dr n. med. Karolina Dulczewska-Cichecka, dr hab. n. med. Zofia Michalewska

Wprowadzenie: Makrotętniak tętnicy siatkówki jest lokalnym okrągłym poszerzeniem i ścięciem ściany naczynia dotyczącym głównie jego rozgałęzienia. Schorzenie to dotyczy przede wszystkim osób z towarzyszącym nadciśnieniem tętniczym, uogólnioną miażdżycą lub podwyższonym stężeniem lipidów we krwi. Pogorszenie ostrości wzroku w przebiegu makrotętniaka występuje rzadko i może być spowodowane obrzękiem plamki, krwotokiem siatkówkowym w wyniku pęknięcia tętniaka lub zamknięciem końcowego odgałęzienia tętniczki przez skrzep.

Opis przypadku: Przedstawiamy ciekawy przypadek 31 letniej kobiety, która zgłosiła się z powodu bezbolesnego pogorszenia widzenia okiem lewym, które pojawiło się nagle około 3 miesięcy temu. Tydzień przed zgłoszeniem się do lekarza pacjentka urodziła dziecko przez cesarskie cięcie.

W przeprowadzonym badaniach (badanie okulistyczne, SOCT, AF) stwierdzono obecność makrotętniaka gałęzi tętnicy środkowej siatkówki z towarzyszącym krwotokiem siatkówkowym. Po konsultacji internistycznej nie stwierdzono towarzyszących chorób ogólnoustrojowych. Zastosowano ogniskową laserokoagulację, w wyniku której doszło do inwolucji zmiany. W trakcie obserwacji doszło do nieznacznej poprawy ostrości wzroku.

Wnioski: W większości przypadków osoby z makrotętniakiem tętnicy siatkówki to osoby starsze (6-7 dekada życia) z towarzyszącymi chorobami ogólnoustrojowymi. Opisujemy nietypowy przypadek makrotętniaka u młodej zdrowej kobiety powikłanego krwotokiem podsiatkówkowym.